

動脈硬化検診 一次解析 結果報告

年度：2019 年度

地区：全体

受診者数：1,142人(平均：69.97歳)

男性461人(平均：69.74歳)・女性681人(平均：70.13歳)

【受診者詳細】

		男性内 or 女性内での%	来場者全体内での%
対象人数 (男性)	498名	受診人数(男性)	461名 受診率： 92.5%
対象人数 (女性)	725名	受診人数(女性)	681名 受診率： 93.9%
対象人数 (全体)	1,223名	受診人数(全体)	1,142名 受診率： 93.3%

受診者	年齢								75歳	
	<30	30≤<40	40≤<50	50≤<60	60≤<70	70≤<80	80≤<90	90≤		
男性	2名(100%)	0名(0%)	23名(46.94%)	31名(35.23%)	157名(42.78%)	166名(37.99%)	78名(40.84%)	4名(50%)	461名(40.37%)	161名(40.25%)
女性	0名(0%)	0名(0%)	26名(53.06%)	57名(64.77%)	210名(57.22%)	271名(62.01%)	113名(59.16%)	4名(50%)	681名(59.63%)	239名(59.75%)
全体	2名(0.18%)	0名(0%)	49名(4.29%)	88名(7.71%)	367名(32.14%)	437名(38.27%)	191名(16.73%)	8名(0.7%)	1,142名(100%)	400名(35.03%)

1) 慢性腎臓病 (CKD) 罹患率

年齢階層内での% 母集団内での%

項目		年齢								年齢	
		<30	30≤<40	40≤<50	50≤<60	60≤<70	70≤<80	80≤<90	90≤		
項目	G1 正常または高値≥90	1名 (50%)	0名 (0%)	8名 (34.78%)	3名 (9.68%)	18名 (11.46%)	11名 (6.63%)	2名 (2.56%)	1名 (25%)	44名 (9.54%)	6名 (3.73%)
	G2 正常または軽度低下80~89	1名 (50%)	0名 (0%)	15名 (65.22%)	24名 (77.42%)	109名 (69.43%)	114名 (68.67%)	37名 (47.44%)	0名 (0%)	300名 (65.08%)	91名 (56.52%)
	G3a 軽度~中等度低下45~59	0名 (0%)	0名 (0%)	0名 (0%)	4名 (12.9%)	27名 (17.2%)	32名 (19.28%)	26名 (33.33%)	1名 (25%)	90名 (19.52%)	43名 (26.71%)
	G3b 中等度~高度低下30~44	0名 (0%)	0名 (0%)	0名 (0%)	0名 (0%)	3名 (1.91%)	6名 (3.61%)	10名 (12.82%)	2名 (50%)	21名 (4.58%)	16名 (9.94%)
	G4 高度低下15~29	0名 (0%)	0名 (0%)	0名 (0%)	0名 (0%)	0名 (0%)	1名 (0.6%)	3名 (3.85%)	0名 (0%)	4名 (0.87%)	4名 (2.48%)
G5 末期腎不全 (ESKD) <15	0名 (0%)	0名 (0%)	0名 (0%)	0名 (0%)	0名 (0%)	2名 (1.2%)	0名 (0%)	0名 (0%)	2名 (0.43%)	1名 (0.62%)	
平均eGFR値 (L/分/1.73 m2)		90	-	88	73	73	69	60	55	70	63
人数 (%)		2名 (0.43%)	0名 (0%)	23名 (4.99%)	31名 (6.72%)	157名 (34.06%)	166名 (36.01%)	78名 (16.92%)	4名 (0.87%)	461名 (100%)	161名 (34.92%)

項目		年齢								年齢	
		<30	30≤<40	40≤<50	50≤<60	60≤<70	70≤<80	80≤<90	90≤		
項目	G1 正常または高値≥90	0名 (0%)	0名 (0%)	11名 (42.31%)	15名 (26.32%)	42名 (20%)	28名 (10.33%)	5名 (4.42%)	0名 (0%)	101名 (14.83%)	14名 (5.86%)
	G2 正常または軽度低下80~89	0名 (0%)	0名 (0%)	15名 (57.69%)	40名 (70.18%)	149名 (70.95%)	190名 (70.11%)	64名 (56.64%)	2名 (50%)	460名 (67.55%)	148名 (61.92%)
	G3a 軽度~中等度低下45~59	0名 (0%)	0名 (0%)	0名 (0%)	2名 (3.51%)	19名 (9.05%)	47名 (17.34%)	34名 (30.09%)	2名 (50%)	104名 (15.27%)	62名 (25.94%)
	G3b 中等度~高度低下30~44	0名 (0%)	0名 (0%)	0名 (0%)	0名 (0%)	0名 (0%)	5名 (1.85%)	10名 (8.85%)	0名 (0%)	15名 (2.2%)	14名 (5.86%)
	G4 高度低下15~29	0名 (0%)	0名 (0%)	0名 (0%)	0名 (0%)	0名 (0%)	0名 (0%)	0名 (0%)	0名 (0%)	0名 (0%)	0名 (0%)
G5 末期腎不全 (ESKD) <15	0名 (0%)	0名 (0%)	0名 (0%)	0名 (0%)	0名 (0%)	1名 (0.37%)	0名 (0%)	0名 (0%)	0名 (0%)	1名 (0.42%)	
平均eGFR値 (L/分/1.73 m2)		-	-	90	83	78	71	63	58	74	66
人数 (%)		0名 (0%)	0名 (0%)	26名 (3.82%)	57名 (8.37%)	210名 (30.84%)	271名 (39.79%)	113名 (16.59%)	4名 (0.59%)	681名 (100%)	239名 (35.1%)

項目		年齢								年齢	
		<30	30≤<40	40≤<50	50≤<60	60≤<70	70≤<80	80≤<90	90≤		
項目	G1 正常または高値≥90	1名 (50%)	0名 (0%)	19名 (38.78%)	18名 (20.45%)	60名 (16.35%)	39名 (8.92%)	7名 (3.66%)	1名 (12.5%)	145名 (12.7%)	20名 (5%)
	G2 正常または軽度低下80~89	1名 (50%)	0名 (0%)	30名 (61.22%)	64名 (72.73%)	258名 (70.3%)	304名 (69.57%)	101名 (52.88%)	2名 (25%)	760名 (66.55%)	239名 (59.75%)
	G3a 軽度~中等度低下45~59	0名 (0%)	0名 (0%)	0名 (0%)	6名 (8.82%)	46名 (12.53%)	79名 (18.08%)	60名 (31.41%)	3名 (37.5%)	194名 (16.99%)	105名 (26.25%)
	G3b 中等度~高度低下30~44	0名 (0%)	0名 (0%)	0名 (0%)	0名 (0%)	3名 (0.82%)	11名 (2.52%)	20名 (10.47%)	2名 (25%)	36名 (3.15%)	30名 (7.5%)
	G4 高度低下15~29	0名 (0%)	0名 (0%)	0名 (0%)	0名 (0%)	0名 (0%)	1名 (0.23%)	3名 (1.57%)	0名 (0%)	4名 (0.35%)	4名 (1%)
G5 末期腎不全 (ESKD) <15	0名 (0%)	0名 (0%)	0名 (0%)	0名 (0%)	0名 (0%)	3名 (0.69%)	0名 (0%)	0名 (0%)	0名 (0%)	3名 (0.26%)	
平均eGFR値 (L/分/1.73 m2)		90	-	89	80	76	70	62	57	72	65
人数 (%)		2名 (0.18%)	0名 (0%)	49名 (4.29%)	88名 (7.71%)	367名 (32.14%)	437名 (38.27%)	191名 (16.73%)	8名 (0.7%)	1,142名 (100%)	400名 (35.03%)

2) 塩分摂取量(推定)

年齢階層内での% 母集団内での%

男性		年齢								年齢 75≤	
		<30	30≤<40	40≤<50	50≤<60	60≤<70	70≤<80	80≤<90	90≤		
項目	平均推定塩分摂取量(g/日)	11.1	-	10.1	9.1	9.2	9.0	8.7	9.1	9.1	8.7
	推定塩分摂取量10g/日以上	2名(100%)	0名(0%)	12名(52.17%)	9名(29.03%)	53名(33.76%)	52名(31.33%)	21名(26.92%)	1名(25%)	150名(32.54%)	41名(25.47%)
	人数(%)	2名(0.44%)	0名(0%)	23名(5.03%)	31名(6.78%)	156名(34.14%)	164名(35.89%)	77名(16.85%)	4名(0.88%)	457名(100%)	159名(34.79%)

女性		年齢								年齢 75≤	
		<30	30≤<40	40≤<50	50≤<60	60≤<70	70≤<80	80≤<90	90≤		
項目	平均推定塩分摂取量(g/日)	-	-	9.3	9.3	9.3	9.0	8.2	7.3	9.0	8.6
	推定塩分摂取量10g/日以上	0名(0%)	0名(0%)	10名(38.46%)	21名(36.84%)	75名(35.71%)	86名(31.73%)	23名(20.35%)	0名(0%)	215名(31.57%)	62名(25.94%)
	人数(%)	0名(0%)	0名(0%)	26名(3.83%)	57名(8.39%)	210名(30.93%)	270名(39.76%)	113名(16.64%)	3名(0.44%)	679名(100%)	238名(35.05%)

男女		年齢								年齢 75≤	
		<30	30≤<40	40≤<50	50≤<60	60≤<70	70≤<80	80≤<90	90≤		
項目	平均推定塩分摂取量(g/日)	11.1	-	9.7	9.2	9.2	9.0	8.4	8.3	9.0	8.6
	推定塩分摂取量10g/日以上	2名(100%)	0名(0%)	22名(44.9%)	30名(34.09%)	128名(34.88%)	138名(31.58%)	44名(23.04%)	1名(12.5%)	365名(31.96%)	103名(25.75%)
	人数(%)	2名(0.18%)	0名(0%)	49名(4.31%)	88名(7.75%)	366名(32.22%)	434名(38.2%)	190名(16.73%)	7名(0.62%)	1,136名(100%)	397名(34.95%)

3) 高血圧罹患率

年齢階層内での% 母集団内での% 区分内での%

男性		年齢								年齢 75≤	
		<30	30≤<40	40≤<50	50≤<60	60≤<70	70≤<80	80≤<90	90≤		
項目	至適血圧	1名(50%)	0名(0%)	10名(43.48%)	8名(25.81%)	29名(18.47%)	25名(15.06%)	12名(15.38%)	1名(25%)	86名(18.66%)	20名(12.42%)
	降圧薬内服あり	0名(0%)	0名(0%)	1名(10%)	1名(12.5%)	10名(34.48%)	5名(20%)	3名(25%)	1名(100%)	21名(24.42%)	5名(25%)
	正常血圧	1名(50%)	0名(0%)	8名(34.78%)	9名(29.03%)	44名(28.03%)	37名(22.29%)	12名(15.38%)	0名(0%)	111名(24.08%)	29名(18.01%)
	降圧薬内服あり	0名(0%)	0名(0%)	0名(0%)	2名(22.22%)	19名(43.18%)	23名(62.16%)	7名(58.33%)	0名(0%)	51名(45.95%)	16名(55.17%)
	正常高値血圧	0名(0%)	0名(0%)	2名(8.7%)	8名(25.81%)	44名(28.03%)	48名(28.92%)	25名(32.05%)	1名(25%)	128名(27.77%)	50名(31.06%)
	降圧薬内服あり	0名(0%)	0名(0%)	0名(0%)	2名(25%)	19名(43.18%)	29名(60.42%)	19名(76%)	1名(100%)	70名(54.69%)	37名(74%)
	高血圧	0名(0%)	0名(0%)	3名(13.04%)	6名(19.35%)	40名(25.48%)	56名(33.73%)	29名(37.18%)	2名(50%)	136名(29.5%)	62名(38.51%)
	降圧薬内服あり	0名(0%)	0名(0%)	1名(33.33%)	1名(16.67%)	20名(50%)	29名(51.79%)	18名(62.07%)	2名(100%)	71名(52.21%)	37名(59.68%)
降圧薬内服あり	0名(0%)	0名(0%)	2名(8.7%)	6名(19.35%)	68名(43.31%)	86名(51.81%)	47名(60.26%)	4名(100%)	213名(46.2%)	95名(59.01%)	
平均血圧(SBP/DBPmmHg)(全体)	117/62.5	-	123.13/72.74	127.23/79.06	132.83/76.9	134.3/70.99	137.85/70.82	134.5/59.5	-	133.29/73.47	137.05/70.28
平均血圧(SBP/DBPmmHg)(内服-)	117/62.5	-	123.13/72.74	127.23/79.06	132.83/76.9	134.3/70.99	137.85/70.82	134.5/59.5	-	133.29/73.47	137.05/70.28
平均血圧(SBP/DBPmmHg)(内服+)	-	-	128.5/87	127.17/78.83	134.07/76.88	136.12/70.03	140.28/70.43	134.5/59.5	-	136.03/72.52	138.91/69.29
人数(%)	2名(0.43%)	0名(0%)	23名(4.99%)	31名(6.72%)	157名(34.06%)	166名(36.01%)	78名(16.92%)	4名(0.87%)	-	461名(100%)	161名(34.92%)

女性		年齢								年齢 75≤	
		<30	30≤<40	40≤<50	50≤<60	60≤<70	70≤<80	80≤<90	90≤		
項目	至適血圧	0名(0%)	0名(0%)	24名(92.31%)	25名(43.86%)	61名(29.05%)	47名(17.34%)	15名(13.27%)	0名(0%)	172名(25.26%)	36名(15.06%)
	降圧薬内服あり	0名(0%)	0名(0%)	2名(8.33%)	0名(0%)	5名(8.2%)	12名(25.53%)	13名(66.67%)	0名(0%)	32名(18.6%)	23名(63.89%)
	正常血圧	0名(0%)	0名(0%)	2名(7.69%)	12名(21.05%)	47名(22.38%)	56名(20.66%)	15名(13.27%)	0名(0%)	132名(31.38%)	37名(15.48%)
	降圧薬内服あり	0名(0%)	0名(0%)	0名(0%)	3名(25%)	11名(23.4%)	29名(51.79%)	10名(66.67%)	0名(0%)	53名(40.15%)	21名(56.76%)
	正常高値血圧	0名(0%)	0名(0%)	0名(0%)	11名(19.3%)	58名(27.62%)	73名(26.94%)	20名(17.7%)	0名(0%)	162名(23.79%)	50名(20.92%)
	降圧薬内服あり	0名(0%)	0名(0%)	0名(0%)	6名(54.55%)	21名(36.21%)	50名(68.49%)	13名(65%)	0名(0%)	90名(55.56%)	36名(72%)
	高血圧	0名(0%)	0名(0%)	0名(0%)	9名(15.79%)	44名(20.95%)	95名(35.06%)	63名(55.75%)	4名(100%)	215名(31.57%)	116名(48.54%)
	降圧薬内服あり	0名(0%)	0名(0%)	0名(0%)	1名(11.11%)	17名(38.64%)	60名(63.16%)	42名(66.67%)	4名(100%)	124名(57.67%)	82名(70.69%)
降圧薬内服あり	0名(0%)	0名(0%)	2名(7.69%)	10名(17.54%)	54名(25.71%)	151名(55.72%)	78名(69.03%)	4名(100%)	299名(43.91%)	162名(67.78%)	
平均血圧(SBP/DBPmmHg)(全体)	-	-	104.69/65.85	121.96/71.84	129.07/71.69	135.71/71.6	142.2/68.73	145.75/72.5	-	132.46/70.95	139.42/69.58
平均血圧(SBP/DBPmmHg)(内服-)	-	-	104.69/65.85	121.96/71.84	129.07/71.69	135.71/71.6	142.2/68.73	145.75/72.5	-	132.46/70.95	139.42/69.58
平均血圧(SBP/DBPmmHg)(内服+)	-	-	115/69	133.5/79.2	135/73.94	138.36/72.46	140.82/67.82	145.75/72.5	-	138.17/71.72	140.01/69.25
人数(%)	0名(0%)	0名(0%)	26名(3.82%)	57名(8.37%)	210名(30.84%)	271名(39.79%)	113名(16.59%)	4名(0.59%)	-	681名(100%)	239名(35.1%)

男女		年齢								年齢 75≤	
		<30	30≤<40	40≤<50	50≤<60	60≤<70	70≤<80	80≤<90	90≤		
項目	至適血圧	1名(50%)	0名(0%)	34名(69.39%)	33名(37.5%)	90名(24.52%)	72名(16.46%)	27名(14.14%)	1名(12.5%)	258名(22.59%)	56名(14%)
	降圧薬内服あり	0名(0%)	0名(0%)	3名(8.82%)	1名(3.03%)	15名(16.67%)	17名(23.61%)	16名(59.26%)	1名(100%)	53名(20.54%)	28名(50%)
	正常血圧	1名(50%)	0名(0%)	10名(20.41%)	21名(23.86%)	91名(24.8%)	93名(21.28%)	27名(14.14%)	0名(0%)	243名(21.28%)	66名(16.5%)
	降圧薬内服あり	0名(0%)	0名(0%)	0名(0%)	5名(23.81%)	30名(32.97%)	52名(55.91%)	17名(62.96%)	0名(0%)	104名(42.8%)	37名(56.06%)
	正常高値血圧	0名(0%)	0名(0%)	2名(4.08%)	19名(21.59%)	102名(27.79%)	121名(27.69%)	45名(23.56%)	1名(12.5%)	290名(25.39%)	100名(25%)
	降圧薬内服あり	0名(0%)	0名(0%)	0名(0%)	8名(42.11%)	40名(39.22%)	79名(65.29%)	32名(71.11%)	1名(100%)	180名(55.17%)	73名(73%)
	高血圧	0名(0%)	0名(0%)	3名(6.12%)	15名(17.05%)	84名(22.89%)	151名(34.55%)	92名(48.17%)	6名(75%)	351名(30.74%)	178名(44.5%)
	降圧薬内服あり	0名(0%)	0名(0%)	1名(33.33%)	2名(13.33%)	37名(44.05%)	89名(58.94%)	60名(65.22%)	6名(100%)	195名(55.56%)	119名(66.85%)
降圧薬内服あり	0名(0%)	0名(0%)	4名(8.16%)	16名(18.18%)	122名(33.24%)	237名(54.23%)	125名(65.45%)	8名(100%)	512名(44.83%)	257名(64.25%)	
平均血圧(SBP/DBPmmHg)(全体)	117/62.5	-	113.35/69.08	123.82/74.39	130.68/73.92	135.17/71.37	140.42/69.58	140.13/66	-	132.8/71.97	138.47/69.86
平均血圧(SBP/DBPmmHg)(内服-)	117/62.5	-	113.35/69.08	123.82/74.39	130.68/73.92	135.17/71.37	140.42/69.58	140.13/66	-	132.8/71.97	138.47/69.86
平均血圧(SBP/DBPmmHg)(内服+)	-	-	121.75/78	131.13/79.06	134.48/75.58	137.54/71.58	140.62/68.8	140.13/66	-	137.28/72.05	139.6/69.27
人数(%)	2名(0.18%)	0名(0%)	49名(4.29%)	88名(7.71%)	367名(32.14%)	437名(38.27%)	191名(16.73%)	8名(0.7%)	-	1,142名(100%)	400名(35.03%)

4) 糖尿病罹患率

年齢階層内での% 母集団内での%

男性		年齢								75歳	
		<30	30≤<40	40≤<50	50≤<60	60≤<70	70≤<80	80≤<90	90≤		
項目	空腹時BS126mg/dl以上、 随時BSの場合は200mg/dl以上、 もしくはHbA1c 5%以上、 または、薬物治療を受けている人	0名 (0%)	0名 (0%)	0名 (0%)	1名 (3.23%)	30名 (19.11%)	26名 (15.66%)	19名 (24.36%)	0名 (0%)	76名 (18.49%)	29名 (6.29%)
上記に該当しない人		2名 (100%)	0名 (0%)	23名 (100%)	30名 (96.77%)	127名 (80.89%)	140名 (84.34%)	59名 (75.64%)	4名 (100%)	385名 (83.51%)	432名 (93.71%)
DM+ 加療+ の人		0名 (0%)	0名 (0%)	0名 (0%)	1名 (3.23%)	13名 (8.28%)	9名 (5.42%)	5名 (6.41%)	0名 (0%)	28名 (8.07%)	8名 (1.74%)
DM+ 加療- の人		0名 (0%)	0名 (0%)	0名 (0%)	0名 (0%)	12名 (7.64%)	15名 (9.04%)	10名 (12.82%)	0名 (0%)	37名 (8.03%)	17名 (3.69%)
平均HbA1c (%) (全体)		5.4	-	5.4	5.7	5.8	5.8	5.9	5.8	5.8	5.8
平均HbA1c (%) (DM-)		5.4	-	5.4	5.6	5.6	5.6	5.6	5.8	5.6	5.6
平均HbA1c (%) (DM+ 加療+)		-	-	-	8.7	6.9	7.0	7.0	-	7.0	7.0
平均HbA1c (%) (DM+ 加療-)		-	-	-	-	6.9	6.9	6.8	-	6.9	6.7
人数 (%)		2名 (0.43%)	0名 (0%)	23名 (4.99%)	31名 (6.72%)	157名 (34.06%)	166名 (36.01%)	78名 (16.92%)	4名 (0.87%)	461名 (100%)	461名 (100%)

女性		年齢								75歳	
		<30	30≤<40	40≤<50	50≤<60	60≤<70	70≤<80	80≤<90	90≤		
項目	空腹時BS126mg/dl以上、 随時BSの場合は200mg/dl以上、 もしくはHbA1c 5%以上、 または、薬物治療を受けている人	0名 (0%)	0名 (0%)	0名 (0%)	5名 (8.77%)	13名 (6.19%)	38名 (14.02%)	11名 (9.73%)	1名 (25%)	68名 (9.99%)	30名 (4.41%)
上記に該当しない人		0名 (0%)	0名 (0%)	26名 (100%)	52名 (91.23%)	197名 (93.81%)	233名 (85.98%)	102名 (90.27%)	3名 (75%)	613名 (90.01%)	651名 (95.59%)
DM+ 加療+ の人		0名 (0%)	0名 (0%)	0名 (0%)	1名 (1.75%)	2名 (0.95%)	17名 (6.27%)	3名 (2.65%)	0名 (0%)	23名 (3.38%)	12名 (1.76%)
DM+ 加療- の人		0名 (0%)	0名 (0%)	0名 (0%)	3名 (5.26%)	9名 (4.29%)	13名 (4.8%)	6名 (5.31%)	1名 (25%)	32名 (4.7%)	14名 (2.06%)
平均HbA1c (%) (全体)		-	-	5.5	5.7	5.8	5.9	5.8	6.0	5.8	5.8
平均HbA1c (%) (DM-)		-	-	5.5	5.6	5.7	5.7	5.6	5.8	5.7	5.7
平均HbA1c (%) (DM+ 加療+)		-	-	-	7.7	6.9	7.2	7.6	-	7.3	7.4
平均HbA1c (%) (DM+ 加療-)		-	-	-	6.4	7.3	6.7	6.8	6.5	6.9	6.8
人数 (%)		0名 (0%)	0名 (0%)	26名 (3.82%)	57名 (8.37%)	210名 (30.84%)	271名 (39.79%)	113名 (16.59%)	4名 (0.59%)	681名 (100%)	681名 (100%)

男女		年齢								75歳	
		<30	30≤<40	40≤<50	50≤<60	60≤<70	70≤<80	80≤<90	90≤		
項目	空腹時BS126mg/dl以上、 随時BSの場合は200mg/dl以上、 もしくはHbA1c 5%以上、 または、薬物治療を受けている人	0名 (0%)	0名 (0%)	0名 (0%)	6名 (6.82%)	43名 (11.72%)	64名 (14.65%)	30名 (15.71%)	1名 (12.5%)	144名 (12.61%)	59名 (5.17%)
上記に該当しない人		2名 (100%)	0名 (0%)	49名 (100%)	82名 (93.18%)	324名 (88.28%)	373名 (85.35%)	161名 (84.29%)	7名 (87.5%)	998名 (87.39%)	1,083名 (94.83%)
DM+ 加療+ の人		0名 (0%)	0名 (0%)	0名 (0%)	2名 (2.27%)	15名 (4.09%)	26名 (5.95%)	8名 (4.19%)	0名 (0%)	51名 (4.47%)	20名 (1.75%)
DM+ 加療- の人		0名 (0%)	0名 (0%)	0名 (0%)	3名 (3.41%)	21名 (5.72%)	28名 (6.41%)	16名 (8.38%)	1名 (12.5%)	69名 (6.04%)	51名 (4.47%)
平均HbA1c (%) (全体)		5.4	-	5.5	5.7	5.8	5.8	5.8	5.9	5.8	5.8
平均HbA1c (%) (DM-)		5.4	-	5.5	5.6	5.7	5.7	5.7	5.8	5.7	5.7
平均HbA1c (%) (DM+ 加療+)		-	-	-	8.2	6.9	7.2	7.3	-	7.1	7.2
平均HbA1c (%) (DM+ 加療-)		-	-	-	6.4	7.1	6.8	6.8	6.5	6.9	6.7
人数 (%)		2名 (0.18%)	0名 (0%)	49名 (4.29%)	88名 (7.71%)	367名 (32.14%)	437名 (38.27%)	191名 (16.73%)	8名 (0.7%)	1,142名 (100%)	1,142名 (100%)

5) 脂質異常症罹患率

年齢階層内での% 母集団内での% 該当者内での%

項目	男性	年齢								75歳		
		<30	30≤<40	40≤<50	50≤<60	60≤<70	70≤<80	80≤<90	90≤			
LDLコレステロール	180mg/dl ≤	0名(0%)	0名(0%)	1名(4.35%)	2名(6.45%)	3名(1.91%)	2名(1.2%)	2名(2.56%)	0名(0%)	10名(2.17%)	3名(1.86%)	
	140 ≤ <180mg/dl	0名(0%)	0名(0%)	7名(30.43%)	7名(22.58%)	22名(14.01%)	26名(15.66%)	4名(5.13%)	0名(0%)	66名(14.32%)	20名(12.42%)	
	120 ≤ <140mg/dl	0名(0%)	0名(0%)	5名(21.74%)	6名(19.35%)	35名(22.29%)	34名(20.48%)	10名(12.82%)	1名(25%)	91名(19.74%)	23名(14.29%)	
	<120mg/dl	2名(100%)	0名(0%)	10名(43.48%)	16名(51.61%)	97名(61.78%)	104名(62.65%)	62名(79.49%)	3名(75%)	294名(63.77%)	115名(71.43%)	
	平均LDL-C値(mg/dl)	96	-	124	120	113	112	100	88	111	106	
	中性脂肪	1000mg/dl ≤	0名(0%)	0名(0%)	0名(0%)	0名(0%)	0名(0%)	0名(0%)	0名(0%)	0名(0%)	0名(0%)	0名(0%)
		300 ≤ <1000 mg/dl	0名(0%)	0名(0%)	1名(4.35%)	1名(3.23%)	2名(1.27%)	4名(2.41%)	1名(1.28%)	0名(0%)	9名(1.95%)	2名(1.24%)
		150 ≤ <300 mg/dl	0名(0%)	0名(0%)	5名(21.74%)	12名(38.71%)	24名(15.29%)	18名(10.84%)	6名(7.69%)	0名(0%)	65名(14.1%)	12名(7.45%)
		<150 mg/dl	2名(100%)	0名(0%)	17名(73.91%)	18名(58.06%)	131名(83.44%)	144名(86.75%)	71名(91.03%)	4名(100%)	387名(83.85%)	147名(91.3%)
		平均TG値(mg/dl)	57	-	120	141	108	100	88	79	104	90
	HDLコレステロール	< 40mg/dl	0名(0%)	0名(0%)	2名(8.7%)	2名(6.45%)	16名(10.19%)	11名(6.63%)	12名(15.38%)	0名(0%)	43名(9.33%)	19名(11.8%)
		40mg/dl ≤	2名(100%)	0名(0%)	21名(91.3%)	29名(93.55%)	141名(89.81%)	155名(93.37%)	66名(84.62%)	4名(100%)	418名(90.67%)	142名(88.2%)
		平均HDL-C値(mg/dl)	45	-	55	60	59	57	54	57	57	55
内服治療あり	0名(0%)	0名(0%)	0名(0%)	4名(12.9%)	32名(20.38%)	35名(21.08%)	14名(17.95%)	1名(25%)	86名(18.66%)	33名(20.5%)		
上記に該当しない人	2名(100%)	0名(0%)	23名(100%)	27名(87.1%)	125名(79.62%)	131名(78.92%)	64名(82.05%)	3名(75%)	375名(81.34%)	128名(79.5%)		
人数(%)	2名(0.43%)	0名(0%)	23名(4.99%)	31名(6.72%)	157名(34.06%)	166名(36.01%)	78名(16.92%)	4名(0.87%)	461名(100%)	161名(34.92%)		

項目	女性	年齢								75歳		
		<30	30≤<40	40≤<50	50≤<60	60≤<70	70≤<80	80≤<90	90≤			
LDLコレステロール	180mg/dl ≤	0名(0%)	0名(0%)	0名(0%)	4名(7.02%)	12名(5.74%)	10名(3.69%)	3名(2.65%)	0名(0%)	29名(4.26%)	5名(2.09%)	
	140 ≤ <180mg/dl	0名(0%)	0名(0%)	6名(23.08%)	11名(19.3%)	59名(28.23%)	57名(21.03%)	23名(20.35%)	1名(25%)	157名(23.09%)	48名(20.86%)	
	120 ≤ <140mg/dl	0名(0%)	0名(0%)	4名(15.38%)	10名(17.54%)	62名(29.67%)	66名(24.35%)	19名(16.81%)	0名(0%)	161名(23.88%)	49名(20.5%)	
	<120mg/dl	0名(0%)	0名(0%)	16名(61.54%)	32名(56.14%)	76名(36.36%)	138名(50.92%)	68名(60.18%)	3名(75%)	333名(48.97%)	137名(57.32%)	
	平均LDL-C値(mg/dl)	-	-	113	120	131	120	116	108	122	116	
	中性脂肪	1000mg/dl ≤	0名(0%)	0名(0%)	0名(0%)	0名(0%)	0名(0%)	0名(0%)	0名(0%)	0名(0%)	0名(0%)	0名(0%)
		300 ≤ <1000 mg/dl	0名(0%)	0名(0%)	0名(0%)	1名(1.75%)	3名(1.43%)	3名(1.11%)	2名(1.77%)	0名(0%)	9名(1.32%)	2名(0.84%)
		150 ≤ <300 mg/dl	0名(0%)	0名(0%)	4名(15.38%)	3名(5.26%)	33名(15.71%)	38名(14.02%)	14名(12.39%)	2名(50%)	94名(13.8%)	32名(13.39%)
		<150 mg/dl	0名(0%)	0名(0%)	22名(84.62%)	53名(92.98%)	174名(82.86%)	230名(84.87%)	97名(85.84%)	2名(50%)	578名(84.88%)	205名(85.77%)
		平均TG値(mg/dl)	-	-	80	86	104	105	107	152	103	107
	HDLコレステロール	< 40mg/dl	0名(0%)	0名(0%)	1名(3.85%)	0名(0%)	5名(2.38%)	10名(3.69%)	4名(3.54%)	0名(0%)	20名(2.94%)	6名(2.51%)
		40mg/dl ≤	0名(0%)	0名(0%)	25名(96.15%)	57名(100%)	205名(97.62%)	261名(96.31%)	109名(96.46%)	4名(100%)	661名(97.06%)	233名(97.49%)
		平均HDL-C値(mg/dl)	-	-	68	75	67	63	62	60	65	62
内服治療あり	0名(0%)	0名(0%)	0名(0%)	6名(10.53%)	44名(20.95%)	80名(29.52%)	27名(23.89%)	2名(50%)	158名(23.35%)	65名(27.2%)		
上記に該当しない人	0名(0%)	0名(0%)	26名(100%)	51名(88.47%)	166名(79.48%)	191名(70.48%)	86名(76.11%)	2名(50%)	622名(76.65%)	174名(72.8%)		
人数(%)	0名(0%)	0名(0%)	26名(3.82%)	57名(8.37%)	210名(30.84%)	271名(39.79%)	113名(16.59%)	4名(0.59%)	681名(100%)	239名(35.1%)		

項目	男女	年齢								75歳		
		<30	30≤<40	40≤<50	50≤<60	60≤<70	70≤<80	80≤<90	90≤			
LDLコレステロール	180mg/dl ≤	0名(0%)	0名(0%)	1名(2.04%)	6名(6.82%)	15名(4.1%)	12名(2.75%)	5名(2.62%)	0名(0%)	39名(3.42%)	8名(2%)	
	140 ≤ <180mg/dl	0名(0%)	0名(0%)	13名(56.53%)	18名(20.45%)	81名(22.13%)	83名(18.99%)	27名(14.14%)	1名(12.5%)	223名(19.54%)	68名(17%)	
	120 ≤ <140mg/dl	0名(0%)	0名(0%)	9名(18.37%)	16名(18.18%)	97名(26.5%)	100名(22.88%)	29名(15.18%)	1名(12.5%)	252名(22.09%)	72名(18%)	
	<120mg/dl	2名(100%)	0名(0%)	26名(53.06%)	48名(54.55%)	173名(47.27%)	242名(55.38%)	130名(68.06%)	6名(75%)	627名(54.95%)	252名(63%)	
	平均LDL-C値(mg/dl)	96	-	118	120	123	117	109	98	118	112	
	中性脂肪	1000mg/dl ≤	0名(0%)	0名(0%)	0名(0%)	0名(0%)	0名(0%)	0名(0%)	0名(0%)	0名(0%)	0名(0%)	0名(0%)
		300 ≤ <1000 mg/dl	0名(0%)	0名(0%)	1名(2.04%)	2名(2.27%)	5名(1.36%)	7名(1.6%)	3名(1.57%)	0名(0%)	18名(1.58%)	4名(1%)
		150 ≤ <300 mg/dl	0名(0%)	0名(0%)	9名(18.37%)	15名(17.05%)	57名(15.53%)	56名(12.81%)	20名(10.47%)	2名(25%)	159名(13.92%)	44名(11%)
		<150 mg/dl	2名(100%)	0名(0%)	39名(79.59%)	71名(80.68%)	305名(83.11%)	374名(85.58%)	168名(87.96%)	6名(75%)	965名(84.5%)	352名(88%)
		平均TG値(mg/dl)	57	-	98	105	106	103	100	116	103	100
	HDLコレステロール	< 40mg/dl	0名(0%)	0名(0%)	3名(6.12%)	2名(2.27%)	21名(5.72%)	21名(4.81%)	16名(8.38%)	0名(0%)	63名(5.52%)	25名(6.25%)
		40mg/dl ≤	2名(100%)	0名(0%)	46名(93.88%)	86名(97.73%)	346名(94.28%)	416名(95.19%)	175名(91.62%)	8名(100%)	1,079名(94.48%)	375名(93.75%)
		平均HDL-C値(mg/dl)	45	-	62	70	64	61	59	59	62	59.43
内服治療あり	0名(0%)	0名(0%)	0名(0%)	10名(11.36%)	76名(20.71%)	115名(26.32%)	41名(21.47%)	3名(37.5%)	245名(21.45%)	98名(24.5%)		
上記に該当しない人	2名(100%)	0名(0%)	49名(100%)	78名(88.64%)	291名(79.29%)	322名(73.68%)	150名(78.53%)	5名(62.5%)	897名(78.55%)	302名(75.5%)		
人数(%)	2名(0.18%)	0名(0%)	49名(4.29%)	88名(7.71%)	367名(32.14%)	437名(38.27%)	191名(16.73%)	8名(0.7%)	1,142名(100%)	400名(35.03%)		

6) 高尿酸血症罹患率

年齢階層内での% 母集団内での% 該当者内での%

男性		年齢								年齢
		<30	30≤<40	40≤<50	50≤<60	60≤<70	70≤<80	80≤<90	90≤	75≤
項目	尿酸値									
	7.0mg/dl <	0名 (0%)	0名 (0%)	4名 (17.39%)	7名 (22.58%)	27名 (17.2%)	26名 (15.66%)	14名 (17.95%)	2名 (50%)	80名 (17.35%)
	≤7.0mg/dl	2名 (100%)	0名 (0%)	19名 (82.61%)	24名 (77.42%)	130名 (82.8%)	140名 (84.34%)	64名 (82.05%)	2名 (50%)	381名 (82.65%)
	平均値 (mg/dl)	5.2	-	6.1	6.4	5.9	5.8	5.7	6.6	5.9
内服治療あり		0名 (0%)	0名 (0%)	1名 (4.35%)	1名 (3.23%)	13名 (8.28%)	19名 (11.45%)	4名 (5.13%)	0名 (0%)	38名 (8.24%)
上記に該当しない人		2名 (100%)	0名 (0%)	22名 (95.65%)	30名 (96.77%)	144名 (91.72%)	147名 (88.55%)	74名 (94.87%)	4名 (100%)	423名 (91.76%)
尿酸値>7.0mg/dlかつ内服治療あり		0名 (0%)	0名 (0%)	0名 (0%)	0名 (0%)	4名 (2.55%)	0名 (0%)	0名 (0%)	0名 (0%)	4名 (0.87%)
人数 (%)		2名 (0.43%)	0名 (0%)	23名 (4.99%)	31名 (6.72%)	157名 (34.06%)	166名 (36.01%)	78名 (16.92%)	4名 (0.87%)	461名 (100%)

女性		年齢								年齢
		<30	30≤<40	40≤<50	50≤<60	60≤<70	70≤<80	80≤<90	90≤	75≤
項目	尿酸値									
	7.0mg/dl <	0名 (0%)	0名 (0%)	1名 (3.85%)	0名 (0%)	4名 (1.9%)	10名 (3.69%)	6名 (5.31%)	0名 (0%)	21名 (3.08%)
	≤7.0mg/dl	0名 (0%)	0名 (0%)	25名 (96.15%)	57名 (100%)	206名 (98.1%)	261名 (96.31%)	107名 (94.69%)	4名 (100%)	660名 (96.92%)
	平均値 (mg/dl)	-	-	4.4	4.2	4.5	4.7	4.8	5.9	4.6
内服治療あり		0名 (0%)	0名 (0%)	0名 (0%)	0名 (0%)	1名 (0.48%)	1名 (0.37%)	0名 (0%)	0名 (0%)	2名 (0.29%)
上記に該当しない人		0名 (0%)	0名 (0%)	26名 (100%)	57名 (100%)	209名 (99.52%)	270名 (99.63%)	113名 (100%)	4名 (100%)	679名 (99.71%)
尿酸値>7.0mg/dlかつ内服治療あり		0名 (0%)	0名 (0%)	0名 (0%)	0名 (0%)	0名 (0%)	0名 (0%)	0名 (0%)	0名 (0%)	0名 (0%)
人数 (%)		0名 (0%)	0名 (0%)	26名 (3.82%)	57名 (8.37%)	210名 (30.84%)	271名 (39.79%)	113名 (16.59%)	4名 (0.59%)	681名 (100%)

男女		年齢								年齢
		<30	30≤<40	40≤<50	50≤<60	60≤<70	70≤<80	80≤<90	90≤	75≤
項目	尿酸値									
	7.0mg/dl <	0名 (0%)	0名 (0%)	5名 (10.2%)	7名 (7.95%)	31名 (8.45%)	36名 (8.24%)	20名 (10.47%)	2名 (25%)	101名 (8.84%)
	≤7.0mg/dl	2名 (100%)	0名 (0%)	44名 (89.8%)	81名 (92.05%)	336名 (91.55%)	401名 (91.76%)	171名 (89.53%)	6名 (75%)	1,041名 (91.16%)
	平均値 (mg/dl)	5.2	-	5.2	5.0	5.1	5.1	5.2	6.2	5.2
内服治療あり		0名 (0%)	0名 (0%)	1名 (2.04%)	1名 (1.14%)	14名 (3.81%)	20名 (4.58%)	4名 (2.09%)	0名 (0%)	40名 (3.5%)
上記に該当しない人		2名 (100%)	0名 (0%)	48名 (97.96%)	87名 (98.86%)	353名 (96.19%)	417名 (95.42%)	187名 (97.91%)	8名 (100%)	1,102名 (96.5%)
尿酸値>7.0mg/dlかつ内服治療あり		0名 (0%)	0名 (0%)	0名 (0%)	0名 (0%)	4名 (1.09%)	0名 (0%)	0名 (0%)	0名 (0%)	4名 (0.35%)
人数 (%)		2名 (0.18%)	0名 (0%)	49名 (4.29%)	88名 (7.71%)	367名 (32.14%)	437名 (38.27%)	191名 (16.73%)	8名 (0.7%)	1,142名 (100%)

7) 動脈硬化罹患率①

年齢階層内での% 母集団内での% 該当者内での%

男性		年齢								年齢 75歳	
		<30	30≤<40	40≤<50	50≤<60	60≤<70	70≤<80	80≤<90	90≤		
項目	頸動脈エコー検査										
	各自の平均IMT値の平均値	0.46	-	0.54	0.64	0.71	0.76	0.80	0.84	0.73	0.78
	1.1mm ≤ 平均IMT値の人	0名(0%)	0名(0%)	0名(0%)	0名(0%)	1名(0.64%)	1名(0.6%)	0名(0%)	0名(0%)	2名(0.43%)	0名(0%)
	プラークが認められた人	0名(0%)	0名(0%)	0名(0%)	1名(3.23%)	31名(19.75%)	58名(34.94%)	34名(43.59%)	3名(75%)	127名(27.55%)	70名(43.48%)
	人数(%)	2名(0.43%)	0名(0%)	23名(4.99%)	31名(6.72%)	157名(34.06%)	166名(36.01%)	78名(16.92%)	4名(0.87%)	461名(100%)	161名(34.92%)
	CAVI										
	平均CAVI値	6.4	-	7.1	8.0	8.6	9.0	10.2	9.7	8.8	9.7
	9.0 ≤ CAVI	0名(0%)	0名(0%)	1名(7.14%)	4名(19.05%)	31名(32.98%)	48名(57.83%)	35名(87.5%)	3名(75%)	122名(47.47%)	62名(74.7%)
	平均ABI値	1.0	-	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.1	1.1
	ABI < 0.9	0名(0%)	0名(0%)	0名(0%)	0名(0%)	1名(1.06%)	0名(0%)	1名(2.5%)	1名(25%)	3名(1.17%)	2名(2.41%)
	実年齢との差の平均(年)	-1.5	-	-1.9	-4.6	-4.2	-6.6	-6.8	-16.5	-6.1	-7.9
	人数(%)	1名(0.39%)	0名(0%)	14名(5.45%)	21名(8.17%)	94名(36.58%)	83名(32.3%)	40名(15.56%)	4名(1.56%)	257名(100%)	83名(32.3%)
	生活習慣病に対する加療あり	0名(0%)	0名(0%)	4名(1.41%)	11名(3.87%)	93名(32.75%)	117名(41.2%)	55名(19.37%)	4名(1.41%)	284名(61.61%)	118名(41.55%)
	心臓血管系イベントの既往あり	0名(0%)	0名(0%)	1名(1.2%)	4名(4.82%)	26名(31.33%)	33名(39.76%)	19名(22.89%)	0名(0%)	83名(18%)	37名(44.58%)
	上記に該当しない人	2名(100%)	0名(0%)	19名(82.61%)	20名(64.52%)	64名(40.76%)	49名(29.52%)	23名(29.49%)	0名(0%)	177名(38.39%)	43名(26.71%)
人数(%)	2名(0.43%)	0名(0%)	23名(4.99%)	31名(6.72%)	157名(34.06%)	166名(36.01%)	78名(16.92%)	4名(0.87%)	461名(100%)	161名(34.92%)	

女性		年齢								年齢 75歳	
		<30	30≤<40	40≤<50	50≤<60	60≤<70	70≤<80	80≤<90	90≤		
項目	頸動脈エコー検査										
	各自の平均IMT値の平均値	-	-	0.52	0.63	0.67	0.72	0.77	0.79	0.70	0.75
	1.1mm ≤ 平均IMT値の人	0名(0%)	0名(0%)	0名(0%)	0名(0%)	0名(0%)	0名(0%)	1名(0.88%)	0名(0%)	1名(0.15%)	1名(0.42%)
	プラークが認められた人	0名(0%)	0名(0%)	0名(0%)	5名(8.77%)	18名(8.57%)	51名(18.82%)	35名(30.97%)	2名(50%)	111名(16.3%)	62名(25.94%)
	人数(%)	0名(0%)	0名(0%)	26名(3.82%)	57名(8.37%)	210名(30.84%)	271名(39.79%)	113名(16.59%)	4名(0.59%)	681名(100%)	239名(35.1%)
	CAVI										
	平均CAVI値	-	-	6.9	7.5	8.0	8.6	9.2	8.0	8.3	9.0
	9.0 ≤ CAVI	0名(0%)	0名(0%)	0名(0%)	1名(2.5%)	20名(14.39%)	58名(36.71%)	32名(54.24%)	0名(0%)	111名(26.68%)	64名(50.39%)
	平均ABI値	-	-	1.0	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.1	1.1
	ABI < 0.9	0名(0%)	0名(0%)	0名(0%)	0名(0%)	2名(1.44%)	0名(0%)	5名(8.47%)	1名(50%)	8名(1.92%)	6名(4.72%)
	実年齢との差の平均(年)	-	-	-2.4	-6.1	-6.2	-5.5	-9.4	-31.3	-7.2	-7.3
	人数(%)	0名(0%)	0名(0%)	18名(4.33%)	40名(9.62%)	139名(33.41%)	158名(37.98%)	59名(14.18%)	2名(0.48%)	416名(100%)	127名(30.53%)
	生活習慣病に対する加療あり	0名(0%)	0名(0%)	3名(0.79%)	15名(3.95%)	82名(21.58%)	184名(48.42%)	92名(24.21%)	4名(1.05%)	380名(55.8%)	186名(48.95%)
	心臓血管系イベントの既往あり	0名(0%)	0名(0%)	1名(1.15%)	3名(3.45%)	16名(18.39%)	38名(43.68%)	28名(32.18%)	1名(1.15%)	87名(12.78%)	52名(59.77%)
	上記に該当しない人	0名(0%)	0名(0%)	23名(88.46%)	42名(73.68%)	128名(60.95%)	87名(32.1%)	21名(18.58%)	0名(0%)	301名(44.2%)	53名(22.18%)
人数(%)	0名(0%)	0名(0%)	26名(3.82%)	57名(8.37%)	210名(30.84%)	271名(39.79%)	113名(16.59%)	4名(0.59%)	681名(100%)	239名(35.1%)	

男女		年齢								年齢 75歳	
		<30	30≤<40	40≤<50	50≤<60	60≤<70	70≤<80	80≤<90	90≤		
項目	頸動脈エコー検査										
	各自の平均IMT値の平均値	0.46	-	0.53	0.63	0.69	0.73	0.78	0.82	0.71	0.76
	1.1mm ≤ 平均IMT値の人	0名(0%)	0名(0%)	0名(0%)	0名(0%)	1名(0.27%)	1名(0.23%)	1名(0.52%)	0名(0%)	3名(0.26%)	1名(0.25%)
	プラークが認められた人	0名(0%)	0名(0%)	0名(0%)	6名(6.82%)	49名(13.35%)	109名(24.94%)	69名(36.13%)	5名(62.5%)	238名(20.84%)	132名(33%)
	人数(%)	2名(0.18%)	0名(0%)	49名(4.29%)	88名(7.71%)	367名(32.14%)	437名(38.27%)	191名(16.73%)	8名(0.7%)	1,142名(100%)	400名(35.03%)
	CAVI										
	平均CAVI値	6.4	-	7.0	7.6	8.2	8.8	9.6	9.1	8.51	9.3
	9.0 ≤ CAVI	0名(0%)	0名(0%)	1名(3.13%)	5名(8.2%)	51名(21.89%)	106名(43.98%)	67名(67.68%)	3名(50%)	233名(34.62%)	126名(60%)
	平均ABI値	1.0	-	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.1	1.1
	ABI < 0.9	0名(0%)	0名(0%)	0名(0%)	0名(0%)	3名(1.29%)	0名(0%)	6名(6.06%)	2名(33.33%)	11名(1.63%)	8名(3.81%)
	実年齢との差の平均(年)	-1.5	-	-2.9	-5.4	-5.3	-5.7	-8.2	-21.3	-5.9	-7.5
	人数(%)	1名(0.15%)	0名(0%)	32名(4.75%)	61名(9.06%)	233名(34.62%)	241名(35.81%)	99名(14.71%)	6名(0.89%)	673名(100%)	210名(31.2%)
	生活習慣病に対する加療あり	0名(0%)	0名(0%)	7名(1.05%)	26名(3.92%)	175名(26.36%)	301名(45.33%)	147名(22.14%)	8名(1.2%)	664名(58.14%)	304名(45.78%)
	心臓血管系イベントの既往あり	0名(0%)	0名(0%)	2名(1.18%)	7名(4.12%)	42名(24.71%)	71名(41.76%)	47名(27.65%)	1名(0.59%)	170名(14.89%)	89名(52.35%)
	上記に該当しない人	2名(0.18%)	0名(0%)	42名(3.68%)	62名(5.43%)	192名(16.81%)	136名(11.91%)	44名(3.85%)	0名(0%)	478名(41.86%)	96名(24%)
人数(%)	2名(0.50%)	0名(0%)	49名(65.31%)	88名(69.32%)	367名(63.49%)	437名(55.15%)	191名(51.83%)	8名(75%)	1,142名(100%)	400名(35.03%)	

8) 身長・体重・BMI分布

年齢階層内での% 母集団内での%

男性		年齢								年齢 75歳	
		<30	30≦<40	40≦<50	50≦<60	60≦<70	70≦<80	80≦<90	90≦		
項目	平均身長(cm)	168.9	-	170.0	168.8	165.0	162.9	159.6	163.5	163.9	161.0
	平均体重(kg)	58.6	-	69.0	70.6	66.0	61.4	60.0	65.3	63.8	60.5
	平均腹囲(cm)	73.0	-	83.7	86.7	86.6	84.7	86.3	93.9	85.7	85.8
	BMI (Body Mass Index)										
	< 18.5	0名(0%)	0名(0%)	3名(13.04%)	2名(6.45%)	2名(1.27%)	6名(3.61%)	4名(5.13%)	0名(0%)	17名(3.69%)	5名(3.11%)
	18.5≦<25	2名(100%)	0名(0%)	10名(43.48%)	16名(51.61%)	103名(65.61%)	125名(75.3%)	50名(64.1%)	2名(50%)	308名(66.81%)	115名(71.43%)
	25 ≦	0名(0%)	0名(0%)	10名(43.48%)	13名(41.94%)	52名(33.12%)	35名(21.08%)	24名(30.77%)	2名(50%)	136名(29.5%)	41名(25.47%)
平均値	20.5	-	23.8	24.7	24.2	23.1	23.5	24.4	23.7	23.3	
人数(%)	2名(0.43%)	0名(0%)	23名(4.99%)	31名(6.72%)	157名(34.06%)	166名(36.01%)	78名(16.92%)	4名(0.87%)	461名(100%)	161名(34.92%)	

女性		年齢								年齢 75歳	
		<30	30≦<40	40≦<50	50≦<60	60≦<70	70≦<80	80≦<90	90≦		
項目	平均身長(cm)	-	-	158.7	156.4	152.8	150.2	146.1	142.4	151.1	147.7
	平均体重(kg)	-	-	54.6	54.8	52.3	53.3	49.1	46.7	52.4	51.1
	平均腹囲(cm)	-	-	76.2	80.5	81.6	84.8	83.6	83.3	82.9	84.5
	BMI (Body Mass Index)										
	< 18.5	0名(0%)	0名(0%)	3名(11.54%)	3名(5.26%)	25名(11.9%)	20名(7.38%)	12名(10.62%)	1名(25%)	64名(9.4%)	22名(9.21%)
	18.5≦<25	0名(0%)	0名(0%)	18名(69.23%)	45名(78.95%)	142名(67.62%)	161名(59.41%)	73名(64.6%)	2名(50%)	441名(64.76%)	145名(60.67%)
	25 ≦	0名(0%)	0名(0%)	5名(19.23%)	9名(15.79%)	43名(20.48%)	90名(33.21%)	28名(24.78%)	1名(25%)	176名(25.84%)	72名(30.13%)
平均値	-	-	21.7	22.4	22.4	23.6	23.0	23.0	22.9	23.4	
人数(%)	0名(0%)	0名(0%)	26名(3.82%)	57名(8.37%)	210名(30.84%)	271名(39.79%)	113名(16.59%)	4名(0.59%)	681名(100%)	239名(35.1%)	

男女		年齢								年齢 75歳	
		<30	30≦<40	40≦<50	50≦<60	60≦<70	70≦<80	80≦<90	90≦		
項目	平均身長(cm)	168.9	-	164.0	160.8	158.0	155.0	151.6	152.9	156.3	153.1
	平均体重(kg)	58.6	-	61.4	60.4	58.2	56.4	53.5	56.0	57.0	54.9
	平均腹囲(cm)	73.0	-	79.7	82.7	83.7	84.7	84.7	88.6	84.0	85.0
	BMI (Body Mass Index)										
	< 18.5	0名(0%)	0名(0%)	6名(12.24%)	5名(5.68%)	27名(7.36%)	26名(5.95%)	16名(8.38%)	1名(12.5%)	81名(7.09%)	27名(6.75%)
	18.5≦<25	2名(100%)	0名(0%)	28名(57.14%)	61名(69.32%)	245名(66.76%)	286名(65.45%)	123名(64.4%)	4名(50%)	749名(65.59%)	260名(65%)
	25 ≦	0名(0%)	0名(0%)	15名(30.61%)	22名(25%)	95名(25.89%)	125名(28.6%)	52名(27.23%)	3名(37.5%)	312名(27.32%)	113名(28.25%)
平均値	20.5	-	22.7	23.2	23.2	23.4	23.2	23.7	23.2	23.4	
人数(%)	2名(0.18%)	0名(0%)	49名(4.29%)	88名(7.71%)	367名(32.14%)	437名(38.27%)	191名(16.73%)	8名(0.7%)	1,142名(100%)	400名(35.03%)	

9) 問診項目

年齢階層内での% 母集団内での%

項目	男性	年齢								母集団	年齢
		<30	30≦<40	40≦<50	50≦<60	60≦<70	70≦<80	80≦<90	90≦		
喫煙	はい	2名(100%)	0名(0%)	13名(56.52%)	7名(22.58%)	37名(23.57%)	25名(15.06%)	5名(6.41%)	0名(0%)	89名(19.31%)	13名(8.07%)
	平均本数(本)	18	-	21	21	20	16	13	-	19	12
いいえ	はい	0名(0%)	0名(0%)	10名(43.48%)	24名(77.42%)	120名(76.43%)	141名(84.94%)	73名(93.59%)	4名(100%)	372名(80.69%)	148名(91.93%)
	人数(%)	2名(0.43%)	0名(0%)	23名(4.99%)	31名(6.72%)	157名(34.06%)	166名(36.01%)	78名(16.92%)	4名(0.87%)	461名(100%)	161名(34.92%)
20歳時から10kg以上増加	はい	1名(50%)	0名(0%)	8名(34.78%)	20名(64.52%)	64名(40.76%)	42名(25.3%)	14名(17.95%)	2名(50%)	151名(32.75%)	31名(19.25%)
	いいえ	1名(50%)	0名(0%)	15名(65.22%)	11名(35.48%)	93名(59.24%)	124名(74.7%)	64名(82.05%)	2名(50%)	310名(67.25%)	130名(80.75%)
人数(%)	はい	2名(0.43%)	0名(0%)	23名(4.99%)	31名(6.72%)	157名(34.06%)	166名(36.01%)	78名(16.92%)	4名(0.87%)	461名(100%)	161名(34.92%)
	30分以上の運動習慣	はい	1名(50%)	0名(0%)	7名(30.43%)	14名(45.16%)	65名(41.4%)	100名(60.24%)	40名(51.28%)	3名(75%)	230名(49.89%)
いいえ	はい	1名(50%)	0名(0%)	16名(69.57%)	17名(54.84%)	92名(58.6%)	66名(39.76%)	38名(48.72%)	1名(25%)	231名(50.11%)	67名(41.61%)
	人数(%)	2名(0.43%)	0名(0%)	23名(4.99%)	31名(6.72%)	157名(34.06%)	166名(36.01%)	78名(16.92%)	4名(0.87%)	461名(100%)	161名(34.92%)
食事の速度	遅い	1名(50%)	0名(0%)	9名(39.13%)	10名(32.26%)	58名(36.94%)	46名(27.71%)	18名(23.08%)	0名(0%)	142名(30.8%)	39名(24.22%)
	普通	1名(50%)	0名(0%)	12名(52.17%)	20名(64.52%)	90名(57.32%)	106名(63.86%)	49名(62.82%)	2名(50%)	280名(60.74%)	101名(62.73%)
遅い	遅い	0名(0%)	0名(0%)	2名(8.7%)	1名(3.23%)	9名(5.73%)	14名(8.43%)	11名(14.1%)	2名(50%)	39名(8.46%)	21名(13.04%)
	人数(%)	2名(0.43%)	0名(0%)	23名(4.99%)	31名(6.72%)	157名(34.06%)	166名(36.01%)	78名(16.92%)	4名(0.87%)	461名(100%)	161名(34.92%)
就寝前2時間での夕食	はい	0名(0%)	0名(0%)	11名(47.83%)	8名(25.81%)	14名(8.92%)	29名(17.47%)	17名(21.79%)	2名(50%)	81名(17.57%)	30名(18.63%)
	いいえ	2名(100%)	0名(0%)	12名(52.17%)	23名(74.19%)	143名(91.08%)	137名(82.53%)	61名(78.21%)	2名(50%)	380名(82.43%)	131名(81.37%)
人数(%)	はい	2名(0.43%)	0名(0%)	23名(4.99%)	31名(6.72%)	157名(34.06%)	166名(36.01%)	78名(16.92%)	4名(0.87%)	461名(100%)	161名(34.92%)
	朝食抜きの食習慣	はい	1名(50%)	0名(0%)	10名(43.48%)	3名(9.68%)	12名(7.64%)	8名(4.82%)	2名(50%)	36名(7.81%)	4名(2.48%)
いいえ	はい	1名(50%)	0名(0%)	13名(56.52%)	28名(90.32%)	145名(92.36%)	158名(95.18%)	76名(97.44%)	4名(100%)	425名(92.19%)	157名(97.52%)
	人数(%)	2名(0.43%)	0名(0%)	23名(4.99%)	31名(6.72%)	157名(34.06%)	166名(36.01%)	78名(16.92%)	4名(0.87%)	461名(100%)	161名(34.92%)
飲酒	毎日	0名(0%)	0名(0%)	8名(34.78%)	13名(41.94%)	72名(45.88%)	64名(38.55%)	17名(21.79%)	1名(25%)	175名(37.96%)	48名(29.81%)
	時々	1名(50%)	0名(0%)	7名(30.43%)	9名(29.03%)	31名(19.75%)	36名(21.69%)	16名(20.51%)	1名(25%)	101名(21.91%)	31名(19.25%)
ほとんど飲まない	毎日	1名(50%)	0名(0%)	8名(34.78%)	9名(29.03%)	54名(34.39%)	66名(39.76%)	45名(57.69%)	2名(50%)	185名(40.13%)	82名(50.93%)
	1回3回以上の飲酒者	0名(0%)	0名(0%)	2名(8.7%)	2名(6.45%)	4名(2.55%)	1名(0.6%)	0名(0%)	0名(0%)	9名(1.95%)	0名(0%)
人数(%)	毎日	2名(0.43%)	0名(0%)	23名(4.99%)	31名(6.72%)	157名(34.06%)	166名(36.01%)	78名(16.92%)	4名(0.87%)	461名(100%)	161名(34.92%)
	睡眠で体重がとれている	はい	2名(100%)	0名(0%)	20名(86.96%)	26名(83.87%)	130名(82.8%)	130名(78.31%)	59名(75.64%)	2名(50%)	369名(80.04%)
いいえ	はい	0名(0%)	0名(0%)	3名(13.04%)	5名(16.13%)	27名(17.2%)	36名(21.69%)	19名(24.36%)	2名(50%)	92名(19.96%)	34名(21.12%)
	人数(%)	2名(0.43%)	0名(0%)	23名(4.99%)	31名(6.72%)	157名(34.06%)	166名(36.01%)	78名(16.92%)	4名(0.87%)	461名(100%)	161名(34.92%)

9) 問診項目

年齢階層内での% 母集団内での%

項目	女性	年齢								母集団	年齢
		<30	30≦<40	40≦<50	50≦<60	60≦<70	70≦<80	80≦<90	90≦		
喫煙	はい	0名(0%)	0名(0%)	4名(15.38%)	3名(5.26%)	9名(4.29%)	1名(0.37%)	1名(0.88%)	0名(0%)	18名(2.64%)	1名(0.42%)
	平均本数(本)	-	-	15	12	8	20	20	-	13	20
いいえ	はい	0名(0%)	0名(0%)	22名(84.62%)	54名(94.74%)	201名(95.71%)	270名(99.63%)	112名(99.12%)	4名(100%)	663名(97.36%)	238名(99.58%)
	人数(%)	0名(0%)	0名(0%)	26名(3.82%)	57名(8.37%)	210名(30.84%)	271名(39.79%)	113名(16.59%)	4名(0.59%)	681名(100%)	239名(35.1%)
20歳時から10kg以上増加	はい	0名(0%)	0名(0%)	4名(15.38%)	17名(29.82%)	55名(26.19%)	96名(35.42%)	31名(27.43%)	1名(25%)	204名(29.96%)	78名(32.64%)
	いいえ	0名(0%)	0名(0%)	22名(84.62%)	40名(70.18%)	155名(73.81%)	175名(64.58%)	82名(72.57%)	3名(75%)	477名(70.04%)	161名(67.36%)
人数(%)	はい	0名(0%)	0名(0%)	26名(3.82%)	57名(8.37%)	210名(30.84%)	271名(39.79%)	113名(16.59%)	4名(0.59%)	681名(100%)	239名(35.1%)
	いいえ	0名(0%)	0名(0%)	26名(3.82%)	57名(8.37%)	210名(30.84%)	271名(39.79%)	113名(16.59%)	4名(0.59%)	681名(100%)	239名(35.1%)
30分以上の運動習慣	はい	0名(0%)	0名(0%)	10名(38.46%)	14名(24.56%)	84名(40%)	134名(49.45%)	51名(45.13%)	1名(25%)	294名(43.17%)	112名(46.86%)
	いいえ	0名(0%)	0名(0%)	16名(61.54%)	43名(75.44%)	126名(60%)	137名(50.55%)	62名(54.87%)	3名(75%)	387名(56.83%)	127名(53.14%)
人数(%)	はい	0名(0%)	0名(0%)	26名(3.82%)	57名(8.37%)	210名(30.84%)	271名(39.79%)	113名(16.59%)	4名(0.59%)	681名(100%)	239名(35.1%)
	いいえ	0名(0%)	0名(0%)	26名(3.82%)	57名(8.37%)	210名(30.84%)	271名(39.79%)	113名(16.59%)	4名(0.59%)	681名(100%)	239名(35.1%)
食事の速度	遅い	0名(0%)	0名(0%)	8名(30.77%)	24名(42.11%)	55名(26.19%)	89名(32.84%)	32名(28.32%)	1名(25%)	209名(30.69%)	70名(29.29%)
	普通	0名(0%)	0名(0%)	14名(53.85%)	26名(45.61%)	136名(64.76%)	158名(58.3%)	67名(59.29%)	3名(75%)	404名(59.32%)	140名(58.58%)
人数(%)	遅い	0名(0%)	0名(0%)	4名(15.38%)	7名(12.28%)	19名(9.05%)	24名(8.86%)	14名(12.39%)	0名(0%)	68名(9.99%)	29名(12.13%)
	普通	0名(0%)	0名(0%)	26名(3.82%)	57名(8.37%)	210名(30.84%)	271名(39.79%)	113名(16.59%)	4名(0.59%)	681名(100%)	239名(35.1%)
就寝前2時間での夕食	はい	0名(0%)	0名(0%)	0名(0%)	6名(10.53%)	16名(7.62%)	32名(11.81%)	19名(16.81%)	1名(25%)	74名(10.87%)	43名(17.99%)
	いいえ	0名(0%)	0名(0%)	26名(100%)	51名(89.47%)	194名(92.38%)	239名(88.19%)	94名(83.19%)	3名(75%)	607名(89.13%)	196名(82.01%)
人数(%)	はい	0名(0%)	0名(0%)	26名(3.82%)	57名(8.37%)	210名(30.84%)	271名(39.79%)	113名(16.59%)	4名(0.59%)	681名(100%)	239名(35.1%)
	いいえ	0名(0%)	0名(0%)	26名(3.82%)	57名(8.37%)	210名(30.84%)	271名(39.79%)	113名(16.59%)	4名(0.59%)	681名(100%)	239名(35.1%)
朝食抜き	はい	0名(0%)	0名(0%)	5名(19.23%)	6名(10.71%)	9名(4.29%)	8名(2.95%)	6名(5.31%)	0名(0%)	34名(5%)	10名(4.18%)
	いいえ	0名(0%)	0名(0%)	21名(80.77%)	50名(89.29%)	201名(95.71%)	263名(97.05%)	107名(94.69%)	4名(100%)	646名(95%)	229名(95.82%)
人数(%)	はい	0名(0%)	0名(0%)	26名(3.82%)	56名(8.24%)	210名(30.88%)	271名(39.85%)	113名(16.62%)	4名(0.59%)	680名(100%)	239名(35.15%)
	いいえ	0名(0%)	0名(0%)	26名(3.82%)	57名(8.37%)	210名(30.84%)	271名(39.79%)	113名(16.59%)	4名(0.59%)	681名(100%)	239名(35.1%)
飲酒	毎日	0名(0%)	0名(0%)	3名(11.54%)	9名(15.79%)	5名(2.38%)	4名(1.48%)	1名(0.88%)	0名(0%)	22名(3.23%)	3名(1.26%)
	時々	0名(0%)	0名(0%)	7名(26.92%)	11名(19.3%)	39名(18.57%)	21名(7.75%)	13名(11.5%)	1名(25%)	92名(13.51%)	22名(9.21%)
ほとんど飲まない	はい	0名(0%)	0名(0%)	16名(61.54%)	37名(64.91%)	166名(79.05%)	246名(90.77%)	99名(87.61%)	3名(75%)	567名(83.26%)	214名(89.54%)
	1回3合以上の飲酒者	0名(0%)	0名(0%)	0名(0%)	1名(1.75%)	1名(0.48%)	0名(0%)	0名(0%)	0名(0%)	2名(0.29%)	0名(0%)
人数(%)	はい	0名(0%)	0名(0%)	26名(3.82%)	57名(8.37%)	210名(30.84%)	271名(39.79%)	113名(16.59%)	4名(0.59%)	681名(100%)	239名(35.1%)
	いいえ	0名(0%)	0名(0%)	21名(80.77%)	39名(68.42%)	157名(74.76%)	206名(76.01%)	80名(70.8%)	3名(75%)	506名(74.3%)	179名(74.9%)
睡眠で休養がとれている	はい	0名(0%)	0名(0%)	5名(19.23%)	18名(31.58%)	53名(25.24%)	65名(23.99%)	33名(29.2%)	1名(25%)	176名(25.7%)	60名(25.1%)
	いいえ	0名(0%)	0名(0%)	26名(3.82%)	57名(8.37%)	210名(30.84%)	271名(39.79%)	113名(16.59%)	4名(0.59%)	681名(100%)	239名(35.1%)

9) 問診項目

年齢階層内での% 母集団内での%

男女	年齢									年齢 75歳
	<30	30歳<40	40歳<50	50歳<60	60歳<70	70歳<80	80歳<90	90歳		
喫煙										
はい	2名(100%)	0名(0%)	17名(34.69%)	10名(11.36%)	46名(12.53%)	26名(5.95%)	6名(3.14%)	0名(0%)	107名(9.37%)	14名(3.5%)
平均本数(本)	18	-	20	18	18	16	15	-	18	12
いいえ	0名(0%)	0名(0%)	32名(65.31%)	78名(88.64%)	321名(87.47%)	411名(94.05%)	185名(96.86%)	8名(100%)	1,035名(90.63%)	386名(96.5%)
人数(%)	2名(0.18%)	0名(0%)	49名(4.29%)	88名(7.71%)	367名(32.14%)	437名(38.27%)	191名(16.73%)	8名(0.7%)	1,142名(100%)	400名(35.03%)
20歳時から10kg以上増加										
はい	1名(50%)	0名(0%)	12名(24.49%)	37名(42.05%)	119名(32.43%)	138名(31.58%)	45名(23.56%)	3名(37.5%)	355名(31.09%)	109名(27.25%)
いいえ	1名(50%)	0名(0%)	37名(75.51%)	51名(57.95%)	248名(67.57%)	299名(68.42%)	146名(76.44%)	5名(62.5%)	787名(68.91%)	291名(72.75%)
人数(%)	2名(0.18%)	0名(0%)	49名(4.29%)	88名(7.71%)	367名(32.14%)	437名(38.27%)	191名(16.73%)	8名(0.7%)	1,142名(100%)	400名(35.03%)
30分以上の運動習慣										
はい	1名(50%)	0名(0%)	17名(34.69%)	28名(31.82%)	149名(40.6%)	234名(53.55%)	91名(47.64%)	4名(50%)	524名(45.88%)	206名(51.5%)
いいえ	1名(50%)	0名(0%)	32名(65.31%)	60名(68.18%)	218名(59.4%)	203名(46.45%)	100名(52.36%)	4名(50%)	618名(54.12%)	194名(48.5%)
人数(%)	2名(0.18%)	0名(0%)	49名(4.29%)	88名(7.71%)	367名(32.14%)	437名(38.27%)	191名(16.73%)	8名(0.7%)	1,142名(100%)	400名(35.03%)
食事の速度										
速い	1名(50%)	0名(0%)	17名(34.69%)	34名(38.64%)	113名(30.79%)	135名(30.89%)	50名(26.18%)	1名(12.5%)	351名(30.74%)	109名(27.25%)
普通	1名(50%)	0名(0%)	26名(53.06%)	46名(52.27%)	226名(61.58%)	264名(60.41%)	116名(60.73%)	5名(62.5%)	684名(59.89%)	241名(60.25%)
遅い	0名(0%)	0名(0%)	6名(12.24%)	8名(9.09%)	28名(7.63%)	38名(8.7%)	25名(13.09%)	2名(25%)	107名(9.37%)	50名(12.5%)
人数(%)	2名(0.18%)	0名(0%)	49名(4.29%)	88名(7.71%)	367名(32.14%)	437名(38.27%)	191名(16.73%)	8名(0.7%)	1,142名(100%)	400名(35.03%)
就寝前2時間での夕食										
はい	0名(0%)	0名(0%)	11名(22.45%)	14名(15.91%)	30名(8.17%)	61名(13.96%)	36名(18.85%)	3名(37.5%)	155名(13.57%)	73名(18.25%)
いいえ	2名(100%)	0名(0%)	38名(77.55%)	74名(84.09%)	337名(91.83%)	376名(86.04%)	155名(81.15%)	5名(62.5%)	987名(86.43%)	327名(81.75%)
人数(%)	2名(0.18%)	0名(0%)	49名(4.29%)	88名(7.71%)	367名(32.14%)	437名(38.27%)	191名(16.73%)	8名(0.7%)	1,142名(100%)	400名(35.03%)
朝食抜きの食習慣										
はい	1名(50%)	0名(0%)	15名(30.61%)	9名(10.34%)	21名(5.72%)	16名(3.66%)	8名(4.19%)	0名(0%)	70名(6.13%)	14名(3.5%)
いいえ	1名(50%)	0名(0%)	34名(69.39%)	78名(89.66%)	346名(94.28%)	421名(96.34%)	183名(95.81%)	8名(100%)	1,071名(93.87%)	386名(96.5%)
人数(%)	2名(0.18%)	0名(0%)	49名(4.29%)	87名(7.62%)	367名(32.16%)	437名(38.3%)	191名(16.74%)	8名(0.7%)	1,141名(100%)	400名(35.06%)
飲酒										
毎日	0名(0%)	0名(0%)	11名(22.45%)	22名(25%)	77名(20.98%)	68名(15.56%)	18名(9.42%)	1名(12.5%)	197名(17.25%)	51名(12.75%)
時々	1名(50%)	0名(0%)	14名(28.57%)	20名(22.73%)	70名(19.07%)	57名(13.04%)	29名(15.18%)	2名(25%)	189名(16.6%)	53名(13.25%)
ほとんど飲まない	1名(50%)	0名(0%)	24名(48.98%)	46名(52.27%)	220名(59.95%)	312名(71.4%)	144名(75.39%)	5名(62.5%)	752名(65.86%)	296名(74%)
1回3合以上の飲酒者	0名(0%)	0名(0%)	2名(4.08%)	3名(3.41%)	5名(1.36%)	1名(0.23%)	0名(0%)	0名(0%)	11名(0.96%)	0名(0%)
人数(%)	2名(0.18%)	0名(0%)	49名(4.29%)	88名(7.71%)	367名(32.14%)	437名(38.27%)	191名(16.73%)	8名(0.7%)	1,142名(100%)	400名(35.03%)
睡眠で体差がとれている										
はい	2名(100%)	0名(0%)	41名(83.67%)	65名(73.86%)	287名(78.2%)	336名(76.89%)	139名(72.77%)	5名(62.5%)	875名(76.62%)	306名(76.5%)
いいえ	0名(0%)	0名(0%)	8名(16.33%)	23名(26.14%)	80名(21.8%)	101名(23.11%)	52名(27.23%)	3名(37.5%)	267名(23.38%)	94名(23.5%)
人数(%)	2名(0.18%)	0名(0%)	49名(4.29%)	88名(7.71%)	367名(32.14%)	437名(38.27%)	191名(16.73%)	8名(0.7%)	1,142名(100%)	400名(35.03%)